



FUNCIÓN: Fungicida microbiológico de protección foliar e inductor de resistencia sistémica vegetal.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. ventas@greencorp.mx

Composición química	% (P/V)
<i>Bacillus spp</i> (1x10 ⁷ ufc/ml)	60.00%
<i>Azotobacter spp</i> (1x10 ⁵ ufc/ml)	5.00%
<i>Pseudomonas spp</i> (1x10 ⁵ ufc/ml)	10.00%
Extractos de origen vegetal	1.00%
Acondicionadores y estabilizadores	24.00%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.045 g/ml; pH: 7.27.

FORMULACIÓN: Líquido soluble

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: **Best Ultra[®] F** es un biofungicida orgánico e inductor de resistencia sistémica de las plantas, único en su tipo. El producto está formulado a partir de bacterias antagonistas y productoras de antibióticos y ha sido acondicionado con extractos vegetales que una vez que son absorbidos por las hojas de las plantas, inducen la resistencia sistémica y forman una película de protección en la superficie de la parte aérea de las plantas protegiéndolas de una amplia gama de enfermedades. **Best Ultra[®] F** es un fungicida recomendado para la prevención y control de algunos hongos que afectan las hojas, tallos, flores y frutos en su desarrollo y poscosecha; tales como: Cenicillas polvorientas, royas, carbones, antracnosis, *Botrytis*. Su acción inductora de resistencia activa el sistema de defensas a enfermedades de la raíz.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse.



DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Cultivo	Arándano, frambuesa, zarzamora, fresa, hortalizas	Aguacate y frutales en general
Enfermedades	Cenicillas polvorientas, royas, carbones, antracnosis y <i>Botrytis</i>	Antracnosis
Dosis	1.0-1.5 L/ha	1.5-2 L/ha
Frecuencia	7-10 días	21 días

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente **Best Ultra® F**, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. **Best Ultra® F** se aplica vía foliar, no acidificar el agua de aplicación para las mezclas.

MÉTODO PARA USAR EL PRODUCTO: Aplicación vía foliar con bomba de mochila, aspersores de aguilón y/o cañón aspersor.

Días a cosecha: 0 días

Horas de reentrada al campo: 2 hrs.

Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: **Best Ultra® F** solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados. **Best Ultra® F** no es compatible con cobres y bactericidas. Evite combinarse con productos o soluciones de pH muy ácido, menores a 6. El producto es compatible y estable en soluciones y con productos de reacción ligeramente ácida o alcalina.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: No es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. El producto es considerado ligeramente tóxico, para humanos y animales. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

