



FICHA TÉCNICA

FUNGICIDA PREVENTIVO ORGÁNICO CON CERTIFICACIÓN OMRI

PRODUCTO

Jaque Mate™, es un Fungicida Preventivo Orgánico con certificación OMRI que actúa contra un amplio rango de especies de hongos fitopatógenos.

INGREDIENTES ACTIVOS:

🌿 Aceite de Canela :	8.00%
🌿 Aceite de Clavo:	2.50%
🌿 Aditivos inertes:	89.50%
🌿 Total :	100.00%

Mezcla patentada de aceites esenciales orgánicos, propiedad de ExcelAg Corp.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- 🌿 **Estado Físico:** Líquido de color amarillo claro
- 🌿 **Olor:** Olor a cítricos, canela.
- 🌿 **Densidad:** 0.93 – 0.97
- 🌿 **pH:** 6.5 – 7.5
- 🌿 **Flamabilidad:** No inflamable
- 🌿 **Solubilidad en agua:** Miscible en agua
- 🌿 **Explosividad:** No explosivo
- 🌿 **Corrosividad:** No corrosivo
- 🌿 **Estabilidad de almacenamiento:** Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

Formulación: Concentrado Soluble (CS)

7300 North Kendall Drive, Suite 521 Miami, FL 33156 – 7851 , USA

Mobile: (311) 122-86-11

E-mail: hcortez@excelag.com

Website : www.excelag.com www.ceagmexico.com





MODO DE ACCIÓN:

Jaque Mate™ actúa por contacto. Debido a su alta presión de vapor, tiene también ligera acción translímitar; sin producir efecto sobre la fauna y flora benéficas. **Jaque Mate™** provee protección preventiva contra un amplio rango de hongos fitopatógenos.

Categoría Toxicológica: Ligeramente Peligroso-Banda verde

RECOMENDACIONES DE USO:

Jaque Mate™ puede usarse en drench, aplicaciones foliares y por los sistemas de riego convencionales. Por ser producto Orgánico y de bajo riesgo, se recomienda usarse con los programas de control Integrado. Evite mezclarse con Azufre o con polvos mojables.

MOMENTOS DE APLICACIÓN:

Por ser producto preventivo y para lograr buenos resultados, **Jaque Mate™** debe aplicarse al inicio de los primeros síntomas y/o al inicio de los cultivos, asegurando una buena cobertura del área foliar.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

No aplique más de dos veces consecutivas y más bien rotar **Jaque Mate™** fungicida orgánico con un producto químico alternativo en aplicación secuencial. Realizar las aplicaciones de **Jaque Mate™** durante las horas más frescas de día. Rocíe directamente sobre el agente patógeno (s). Repetir las aplicaciones a intervalos de 7-10 días, dependiendo de la presión de infestación del cultivo.

Para evitar la degradación del producto, no utilice agua con un pH inferior a 4,0 o superior a 8,0.

Equipo Manual: Cuando se utiliza equipo de manual el uso **Jaque Mate™** 1.0 a 1.5 cc fungicida orgánico / litro de agua.

7300 North Kendall Drive, Suite 521□□Miami, FL 33156 – 7851 , USA

Mobile: (311) 122-86-11

E-mail: hcortez@excelag.com

Website : www.excelag.com www.ceagmexico.com





Mezclar 200- 500cc de **Jaque Mate**™ fungicida orgánico concentrado por cada 400 litros de agua pulverizada. Aplicar suficiente para cubrir toda la superficie de los tejidos infestados.

VOLUMEN DE MEZCLA cc **DE Jaque Mate**™

1 Galón	0.50
5 Galones	2.25
10 Galones	4.50
25 Galones	11.25

El uso de un surfactante-adherente como **SURF ORG**™ puede incrementar el contacto y la eficacia del tratamiento. Comprobar la compatibilidad de pulverización en un pequeño número de plantas antes de la aplicación inicial.

Intervalos previos a la cosecha: **Jaque Mate**™ puede ser aplicado en los cultivos indicados en la tabla uso recomendado en cualquier momento incluso el día de la cosecha.

Periodo de Reingreso: es de 0 (cero) horas, pues **Jaque Mate**™ **puede ser aplicado en los cultivos indicados en la tabla de uso recomendado en cualquier momento y hasta e incluyendo el día de la cosecha.**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (lt./cilindro)	PERIODO DE CARENCIA	PERIODO DE REINGRESO	L.M.R
Tomate, Papa, Paprika, Pimientos	Antracnosis (Colletotrichum coccodes), Mildiu negro (Alternaria alternata), Podredumbre de la raíz (Phytophthora spp.)Tizón Temprano (Alternaria solani), mildiú polvoso(Oidiopsis sicula), Mancha foliar por Septoria (Septoria lycopersici), Mancha foliar (Corynespora cassiicola), Tizon Tardío (Phytophthora nfestans)	0.25 – 0.5	No se Requiere	No se Requiere	No se Requiere
Brásica de tallo verde: Broccoli, Coles de Brusselas, Chinese Repollo, Mostaza china, Coliflor	Mancha foliar por Alternaria, (Alternaria spp.), Mildiu polvoso (Peronospora parasítica)herrumbre blanca (Albugo cándida), Mancha Negra (Alternaria spp.), Mancha Foliar por Cercospora (Cercospora spp Pudrición basal de la raíz, (Rhizoctonia	0.25 – 0.5	No se Requiere	No se Requiere	No se Requiere

7300 North Kendall Drive, Suite 521 Miami, FL 33156 – 7851 , USA

Mobile: (311) 122-86-11

E-mail: hcortez@excelag.com

Website : www.excelag.com www.ceagmexico.com



Cultivo Plaga	Dosis	Dosis (lt./cilindro)	Periodo de Carencia	Periodo de Reingreso	L.M.R.
Cucurbitáceas: Pepino, Melón , Sandía , Calabaza, Calabacín, Zucchini	Antracnosis (Colletotrichum lagenarium), podredumbre deviente (Rhizoctonia solani) Mildiu Velloso (Pseudoperonospora cubensis), Tizón de plantula (Didymella bryoniae), Tizón temprano (Alternaria spp., Cercospora spp.), Cancro por Myrothecium (Myrothecium roridum), Plectosporium (Plectosporium tabacinum), mildiu Polvoriento (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)	0.5 – 1.0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
Vegetales de Bulbo Ajo Puerro Cebolla, Cebolla de bulbo, Cebolla verde	Mancha foliar por Cladosporium (Cladosporium allii), Mancha purpura (Alternaria porri), Roya (Puccinia allii), Mildio polvoso (Peronospora destructor), Mancha foliar por Botrytis (Botrytis aclada), Rhizoctonia dampingoff (Rhizoctonia solani)	0.5 – 1.0	No se requiere	No se requiere	No se requiere
Pera, Duraznos Nueces, Manzanos,	Fire blight , Blossom blast, (Pseudomonas spp).	0.25 – 0.5 Usarse en mezcla de tanque con BACTREX	No se requiere	No se requiere	No se requiere
Bananos, Plátanos	Sigatoka Negra (Mycosphaerella fljensis)	0.25 – 0.35	No se requiere	No se requiere	No se requiere
Café, Cacao, Trigo	Roya (Hemileia vastatrix)	0.25 – 0.5 Usarse en mezcla de tanque con CHAPERONE	No se requiere	No se requiere	No se requiere
Arroz, Maíz	Piricularia,	0.25 – 0.5 Usarse en mezcla de tanque con CHAPERONE	No se requiere	No se requiere	No se requiere
Fresas, Frambuesas, Uvas Berries	Botrytis cinerea Oidium Roya	0.5 -0.9	No se requiere	No se requiere	No se requiere

7300 North Kendall Drive, Suite 521 Miami, FL 33156 – 7851 , USA

Mobile: (311) 122-86-11

E-mail: hcortez@excelag.com

Website : www.excelag.com www.ceagmexico.com



ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenar el contenido en el envase original. Mantenga el envase bien cerrado, no permita que el agua en el contenido del paquete. No contaminar las fuentes de agua por escorrentía o equipo de pulverización. No almacenar cerca de fuentes de calor o llamas. No almacenar junto con agentes oxidantes.

Eliminación de los envases vacíos

Enjuague tres veces el efecto (o equivalente) y añadir el agua de lavado al tanque de pulverización, a continuación, enviarlo para su reciclaje, o perfore y deseche el locales. Si se permite la quema de contenedores, manténgase alejado del humo. La garantía del fabricante y el distribuidor el contenido del envase original herméticamente cerrado y el sello de garantía intacta de acuerdo con los términos de la etiqueta y el prospecto. Los consumidores compren el producto con pleno conocimiento. La Compañía limita su responsabilidad en la venta de este producto a la reposición de los mismos si se encuentra defectuoso. Debido recipiente de acuerdo con las disposiciones de las autoridades a su uso y manejo están fuera de nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños a personas, cultivos y / o del suelo.

CONDICIONES DE VENTA:

La información y las instrucciones establecidas en esta etiqueta son confiables y deben ser observadas cuidadosamente. Un insuficiente control de plagas y posibles daños a los cultivos a los que se aplica con el producto puede producirse por una variedad de razones, por no seguir las instrucciones en esta etiqueta, la falta de apego a las buenas aplicaciones de forma anormal o inusual y las condiciones climáticas no favorables escapan al control de ExcelAG, Corp.

Para mayor información, contactarnos a www.excelag.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

ExcelAG, Corp. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

7300 North Kendall Drive, Suite 521□□Miami, FI 33156 – 7851 , USA

Mobile: (311) 122-86-11

E-mail: hcortez@excelag.com

Website : www.excelag.com www.ceagmexico.com

