



Stoller
México

REGISTRO

Boletín Técnico

VERSIÓN

Á9

CLAVE

S072-L1-P0-0009

PÁGINAS

1 de 3

N - Large®

Tallos mas largos, ganancias mas grandes

N-Large es una solución líquida de Ácido Giberélico (AG3) conteniendo 4% de ingrediente activo natural, listo para ser usado inmediatamente en campo, no necesitando de preparaciones y disoluciones adicionales.

Ha sido diseñado para promover el elongamiento de tallos en flores y ornamentales, manipular la floración y el cuajado de frutos, mejorar el calibre y la calidad de los frutos, reducir los desórdenes fisiológicos, mejorar la vida post cosecha de frutos y disminuir la mano de obra en labores culturales como el raleo de racimos.

INGREDIENTES

% p/p

Acido Giberelico (AG3).....4%

Ventajas de usar N-Large

- Tiene registro OMRI
- Promueve el crecimiento y la elongación de los tallos cuando la planta se arroseta.
- Promueve el crecimiento de los frutos reduciendo los desordenes fisiológicos.
- Promueve el elongamiento del pedúnculo y del escapo floral cuando se presentan condiciones de día corto.
- Incrementa los rendimientos en frutos partenocárpicos (fresa)
- Retarda la maduración de los frutos.
- Mejora la vida de los frutos en post cosecha.
- Promueve la inducción floral en los cultivos.
- Promueve la ruptura de la dormancia o reposo.
- Disminuye las necesidades de labores manuales de raleo.

Dosis y recomendaciones de uso

Agite **N-Large** antes de utilizarlo y dilúyalo en suficiente agua para asegurar un cubrimiento adecuado y uniforme.

Cultivo	Dosis gr i.a./Ha	Dosis Lt/Ha	Momento de aplicación
Banano	3.5 – 5.0	0.10 – 0.15	Realizar una aplicación mensual durante el año.
Café	8.5 – 17.0	0.25 – 0.50	Asperjar foliarmente al hinchado del brote o a la apertura de las primeras flores.
Cítricos (Naranja, Limón, Toronja)	100 – 200		Para retardar la maduración, asperjar 2 semanas antes del cambio de color.
Durazno	10 – 15		Aplicar 2 semanas antes del cambio de color.
Mango	5 – 7 10 – 15	0.15 – 0.20 0.3 – 0.5	(1ª) Aplicar al cuajado del fruto, cuando tenga de 1 a 3 cm de diámetro. (2ª) Aplicar 15 a 20 días antes de la cosecha.
Melón, Sandía	2 – 4 4 – 6 10 – 12	0.06 – 0.12 0.12 – 0.18 0.30 – 0.36	Cuando la planta tenga el 50% de la floración. Cuando los frutos tengan de 2 a 3 cm de diámetro. Asperjar foliarmente 15 días antes de la cosecha.

Peral	2 – 4	0.06 – 0.12	Aplicar foliarmente, cuando los frutos tengan de 2 a 3 cm de diámetro
Piña	296	9	Realizar 1 a 2 aplicaciones 14 a 18 semanas después del forzado de la flor.
Ajo	1 – 2	0.03 – 0.06	Realizar una aplicación a los 30 a 45 días después del transplante.
Alcachofa	25 – 50	0.75 – 1.50	Realizar 1 a 2 aplicaciones 14 a 18 semanas después del forzado
Arroz	2.5 – 7.5 7.5 – 20	0.07 – 0.25 0.25 – 0.60	(1ª) En almácigo, cuando la planta tenga de 2 a 5 hojas verdaderas. (2ª) En campo transplantado, para la extensión de la panícula, aplicar foliarmente durante la formación de la panícula
Cebolla	1 – 2	0.03 – 0.06	Asperjar foliarmente 6 semanas después del transplante.
Espinaca	15 – 20	0.45 – 0.60	Asperjar foliarmente 10 a 18 días antes de la cosecha, de preferencia cuando la temperatura esta entre 4º y 21ºC.
Lechuga	2.5 – 10	0.075 - 0.30	Para obtener semilla. Aplicar cada 2 semanas, 1 a 4 veces. Iniciar a partir de la 4ª hoja verdadera.
Leguminosas (Frijol, Arveja, Soya, etc.)	1 – 2	0.03 – 0.06	Asperjar foliarmente 15 a 20 días después de la germinación.
Papa	1 – 2	0.03 – 0.06	Tratamiento de semilla tubérculo, antes de la siembra, sumergir en la solución durante 15 minutos.
Pimiento	2.5 – 7.5	0.07 – 0.25	Aplicar a partir de la 4ª hoja verdadera, cada 14 días
Tomate	1 2 4	0.03 0.06 0.12	Asperjar 15 días después del transplante. Asperjar en pre floración. Asperjar localizado al fruto 10 – 14 día antes de la cosecha, cuando estos están aún verdes.
Clavel	6 – 10	0.18 – 0.30	Asperjar foliarmente en tres oportunidades: A la 8ª, 12ª y 16ª semanas después del despunte.
Gypsophylla	40 – 60	1.20 – 1.80	Asperjar foliarmente en tres oportunidades: A la 4ª, 6ª y 8ª semanas después del despunte.
Statice	12 – 20	0.36 – 0.60	Asperjar foliarmente en dos oportunidades: A la 6ª y 8ª semanas después del despunte.
Rosas	2	0.06	Asperjar foliarmente después de la poda.
Pastos (Bermuda, King Grass, etc.)	10 – 20	0.30 – 0.60	Asperjar foliarmente a los 7 – 14 días después de cada corte.



Stoller
México

REGISTRO

Boletín Técnico

VERSIÓN

Á9

CLAVE

S072-L1-P0-0009

PÁGINAS

3 de 3

Tratamiento

Papa	30 – 60 mL/200 Lt agua	Tratar la semilla tubérculo antes de la siembra. Sumergir en la solución durante 15 minutos.
Ajo	30 – 60 mL/200 Lt agua	Tratar la semilla antes de la siembra. Sumergir en la solución durante 15 minutos.
Arroz	30 – 60 mL/200 Lt agua	Para 50 Kg de semilla. Tratar la semilla antes de la siembra, impregnar con la solución junto con los fungicidas de uso regular.

Para mayor información consulte con el técnico profesional de Stoller.

N-Large puede aplicarse en el tanque de mezcla con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes foliares.

Orden de Mezcla:

1. Agua 2. Fertilizante Foliar 3. N-Large 4. Plaguicida

Precauciones

- Agite antes de usar
- Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales
- No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante
- Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar para establecer la compatibilidad física de los productos
- Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco
- No aplicar usando métodos de Ultra Bajo Volumen (ULV: Ultra Low Level). Para aplicaciones aéreas el volumen de la solución debe ser de 20 litros, para frutales el volumen debe ser 100 litros
- No aplique en plantas bajo condiciones de estrés nutricional, por agua o por pestes
- Re-aplicar **N-Large** si una lluvia significativa ocurre antes de las 2 horas de haberse aplicado

Peligro

Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los ojos hubieran estado en contacto con el producto, lávalos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

Garantía: El fabricante garantiza el contenido neto del envase de acuerdo a la composición porcentual, así como las recomendaciones de uso contenidas en esta etiqueta; pero no otorga garantía alguna acerca de mal uso y manejo del producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo, almacenaje y aplicación se realizan fuera de nuestro control, quedando bajo responsabilidad total del usuario final.

Medidas de Protección al ambiente:

- Espere las recomendaciones de uso del producto.
- Maneje el envase vacío y los residuos de producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.
- Respete las buenas prácticas agrícolas.
- No tire los envases o empaques vacíos del producto en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- No vierta el remanente del producto o agua de lavado del equipo de aplicación, en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- Respete las dosis y época de aplicación del producto.