



NBX[®]

Aumenta la carga

NBX aumenta la carga de frutos, granos, mazorcas, bellotas, tubérculos, etc. al promover una mejor diferenciación y división celular de los órganos reproductivos resultando en una mayor producción de los cultivos.

Promueve, incrementa y uniformiza la inducción floral para una cuaja uniforme de frutos.

Previene y controla el crecimiento vegetativo vigoroso o excesivo de los brotes y el follaje (enviciamiento) causado por altas temperatura y/o altos niveles de fertilización nitrogenada, en particular de fuentes nítricas, que produce una excesiva producción y transporte de auxinas desde los brotes hacia la parte inferior de la planta, causando el aborto de primordios reproductivos, desordenes fisiológicos y reducción de la calidad y los rendimientos de las cosechas.

INGREDIENTES

% p/p

Boro (B).....9 %

Molibdeno.....0.008%

Modo de acción de NBX

Contiene elicitors que promueven la actividad de las yemas reproductivas contrarrestando la dominancia de las giberelinas (hormona del enviciamiento) resultando en el incremento y uniformidad de la floración y del cuajado de frutos.

Promueve la formación de reguladores de crecimiento naturalmente en la planta, en particular de citoquininas permitiendo un menor requerimiento de aplicación de esta hormona (citoquininas).

Incrementa la vida media de las auxinas, previniendo su transporte fuera de los nuevos crecimientos, evitando el crecimiento vigoroso de los cultivos.

Contiene Poliaminas, aditivos naturales que otorgan una mayor permeabilidad de las membranas celulares permitiendo la redistribución de los fotosintatos desde las hojas hacia los órganos de almacenamiento: frutos, coronas, tallos, raíces, etc.

Dosis y Recomendaciones de Uso

Cultivo	Momento de Aplicación	Lt/Ha	N° Aplic.
Algodón	Aplicar foliarmente 3 Lt/Ha al inicio de la floración (1 – 5 botones florales en 10 m lineales). Hacer una segunda aplicación de 5 Lt/Ha a los 15 – 21 días.	3	2
Maíz	Aplicar foliarmente a la 5ta hoja verdadera.	3	1 – 2
Sorgo	Aplicar foliarmente a la 6ta hoja verdadera.	3	1 – 2
Papa	Aplicar foliarmente en pre-floración, inicio de estolones y tuberización.	3	1 – 2
Cebolla, Ajo	Aplicar foliarmente a partir de la 8ª hoja. Repetir cada 14 – 21 días	3	2
Cucurbitáceas (Cala-bazas, Melón, Pepinos, Sandía,	Aplicar foliarmente en pre-floración. Repetir en cada brote	2- 3	2 – 3

Arroz	45 – 55 días del transplante	2- 3	1
Tomate, Chile, Pimiento	3 – 5 Lt/Ha al inicio de la floración (1 – 5 botones florales en 10 m lineales). Hacer una segunda aplicación de 3 Lt/Ha a los 15 – 21 días.	2- 3	2
Leguminosas	En Pre-Floración	2- 3	1
Zanahoria	A los 55 – 65 días después de la siembra	2- 3	1
Espárrago	Durante el desarrollo del crecimiento vigoroso del brote	3	2 – 3
Vid	A partir de la 14ª - 16ª hoja. Repetir cada 15 días	2 - 4	2 – 3
Cítricos	Inicio del brotamiento. Repetir en cada brote	3	3
Mango	15 – 20 antes de la floración. Repetir al cuajado de frutos	3	2
Olivo	Al inicio del brotamiento. Repetir en cada brote.	3	2 – 3
Aguacate	Al inicio del brotamiento. Repetir en cada brote.	3	2
Manzano	Al inicio del brotamiento. Repetir en cada brote.	3	2
Durazno	Al inicio del brotamiento. Repetir en cada brote.	3	2
Cítricos	Al inicio del brotamiento. Repetir en cada brote.	3	2
Papaya	En pre-floración y en pre-cuajado del fruto	3	2
Piña	En pre-floración y en pre-cuajado del fruto	3	1 - 2
Fresa	En pre-floración y en pre-cuajado del fruto	3	2 - 4
Café	Inicio del brotamiento. Repetir en cada brote.	3	2 - 4
Palma Aceitera	Inicio de floración. Repetir al cuajado del fruto	3	2

Precauciones

No use adherentes en las aplicaciones de NBX

Agite antes de usar.

No emplee si la planta se encuentra en estado de senescencia o madurez natural o presenta bajos niveles de Nitrógeno.

No use en plantas severamente atacadas por insectos picadores chupadores: áfidos, mosca blanca, querasas, etc.

No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar para establecer la compatibilidad física de los productos.

NBX un producto que contiene Boro y debe ser empleado en cultivos que toleran este elemento. Algunos cultivos son sensibles ante el Boro.

Orden de Mezcla

1. Agua 2. NBX 3. Pesticida

Garantía: El fabricante garantiza el contenido neto del envase de acuerdo a la composición porcentual, así como las recomendaciones de uso contenidas en esta etiqueta; pero no otorga garantía alguna acerca de mal uso y manejo del producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo, almacenaje y aplicación se realizan fuera de nuestro control, quedando bajo responsabilidad total del usuario final.

Medidas de Protección al ambiente:

- Espere las recomendaciones de uso del producto.
- Maneje el envase vacío y los residuos de producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.
- Respete las buenas prácticas agrícolas.
- No tire los envases o empaques vacíos del producto en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- No vierta el remanente del producto o gase de lavado del equipo de aplicación, en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- Respete las dosis y época de aplicación del producto.