



**FUNCIÓN:** Promotor de floración y amarre de frutos.

**FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:** GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. ventas@greencorp.mx

Composición garantizada	% (P/V)
Complejo auxínico	1000 ppm
Complejo citocínico	1000 ppm
Giberelinas	500 ppm
Complejo vitamínico	2500 ppm
Complejo de aminoácidos	2.50%
Folcisteína	2500 ppm
Myo-inositol	500 ppm
Fósforo	15.00%
Potasio	5.00%
Magnesio	2.00%
Zinc	5.00%
Azufre	5.00%
Calcio	1.00%
Boro	2.00%
Cobre	0.50%
Molibdeno	1000 ppm
Agentes quelatantes	6.00%
Acondicionadores y diluyentes	55.10%

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:** Densidad: 1.225 g/ml; pH: 3.15

**FORMULACIÓN:** Líquido fluido

**PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN:** Profifix Zit® es un producto regulador de crecimiento, el cual presenta un excelente balance de compuestos tipo hormonal como son: citocininas (Kinetina, 6-BPA y TDZ), auxinas (ácido naftoixacético y 4-CPA) y giberelinas (AG3). Profifix Zit® está especialmente diseñado para coadyuvar en la inducción y diferenciación floral, fortalecer el vigor y viabilidad de las estructuras reproductivas, así como el "cuajado" del fruto en hortalizas y frutales. El proceso de floración demanda aminoácidos específicos, vitaminas, antioxidantes y de todas las hormonas de crecimiento y desarrollo, así como de un alto nivel energético que provee el fósforo y otros compuestos presentes en Profifix Zit® además de otros nutrientes ligados a la floración en mayor grado como el zinc, cobre, boro, magnesio y el molibdeno, los cuales están presentes en esta formulación.



**INSTRUCCIONES DE USO:** Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse.

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Hortalizas en general	0.5-1 L/ha	En plena floración
Granos y cereales	0.5 L/ha	En la etapa de espiga
Frutales en general	1-2 L/ha	En plena floración
Banano	0.5-1.0 L/ha.	La aplicación debe hacerse cuando la planta tenga 12 hojas verdaderas.

**MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO:** Antes de abrir el envase, agite perfectamente, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente que contenga la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. **Prefix Zit®** puede ser aplicado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos. Se recomienda realizar las aplicaciones de **Prefix Zit®** cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad.

**METODO PARA USAR EL PRODUCTO:** Aplicación vía foliar; terrestre (con bomba de mochila, aspersores de aguilón y/o cañón aspersor) o aérea.

**Días a cosecha:** 0 días

**Horas de reentrada al campo:** 1 hrs.

**Límite máximo de residuos:** No tiene.

**INCOMPATIBILIDAD:** **Prefix Zit®** es compatible con la mayoría de los agroquímicos, sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

**TOXICIDAD:** **Prefix Zit®** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

**Edición:** Julio 2018.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

