



FUNCIÓN: Fungicida orgánico microbiológico.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. ventas@greencorp.mx

Composición química	% (P/V)
Aceite de neem	2.50%
Aceite de clavo	2.50%
<i>Bacillus subtilis</i> (1x10 ⁸ ufc/ml)	50.00%
Emulsificantes, acondicionadores y diluyentes	45.00%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.107 g/ml; pH: 8.74.

FORMULACIÓN: Líquido emulsionable

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: **RoyaOut®** es un fungicida orgánico-microbiológico diseñado especialmente para el control de royas o chahuistles y cenicillas en los cultivos de espárrago, pimientos, manzano, peral, cafeto, frambuesa, rosas, granos, cereales, soya, frijol y caña. Los componentes de **RoyaOut®** ofrecen un efecto tanto curativo como preventivo, al ser aplicado sobre el follaje de los cultivos. El *Bacillus subtilis* posee la particularidad de producir antibióticos que evitan el avance de la enfermedad; los compuestos fungicidas aportados por los aceites provocan una deshidratación de esporas y del micelio de los hongos, estas características confieren a **RoyaOut®** una condición única en productos de su tipo evitando así la generación de resistencia cruzada de los hongos fitopatógenos.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítase vigorosamente antes de usarse.



DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Cultivo	Café	Arándano, frambuesa, zarzamora, fresa y hortalizas	Frutales en general
Enfermedades	Roya del café (<i>Hemileia vastatrix</i>)	Royas, midius y cenicillas polvorientas	Royas, midius y cenicillas polvorientas
Dosis	5 ml/L de agua	1-2 L/ha	1-2 L/ha
Frecuencia	3 aplicaciones 1ra en abril 2da en julio 3ra en septiembre	2-3 aplicaciones cada 7-10 días	21 días

Además, se recomienda la aplicación en todos los cultivos de importancia comercial, hortalizas, granos, cereales, forrajes y frutales por la vía foliar a dosis de 1-2 L/ha y mezclándolo preferentemente con 1 L de **Fulvimax Alga+**® y/o empleando fuentes líquidas de materia orgánica conteniendo ácidos fúlvicos, azúcares, aminoácidos y/o proteínas para favorecer la activación y funcionalidad del complejo microbiológico.

Aplicar preventivamente 0.5 L/ha en 200 L de agua para control aplicar de 1-1.5 L/ha en 300-800 L de agua. Frecuentemente máxima cada 15 días. **RoyaOut**® puede alternarse con otros productos para el control de la enfermedad.

MÉTODO PARA USAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Aplicar por vía foliar con mochila aspersora, equipo de aguilón o aspersora de cañón. Aplicación foliar, no acidificar el agua de aplicación para las mezclas.

Días a cosecha: 0 días

Horas de reentrada al campo: 4 hrs.

Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: **RoyaOut**® no es compatible con cobres y bactericidas, evite combinarse con productos por soluciones de pH muy ácidos, menores a 6. El producto es compatible y estable en soluciones y con productos de reacción ligeramente ácida o alcalina.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos. No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: **RoyaOut**® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

